

Contact: QALIAN* au **05 55 25 19 66**

Vita-Abeille

- [ACCUEIL](#)
- [APISTAN](#)
- [APIGUARD](#)

* Titulaire des AMM Apistan et Apiguard: Vita-Europe (Ltd) - Royaume-Uni. Exploitant des AMM Apistan et Apiguard: QALIAN - 49503 Segre cedex.



APIGUARD (varroa)

Un traitement naturel, sûr et fiable contre le varroa.

APIGUARD optimise les bienfaits du thymol.

Une option d'alternance des traitements contre la résistance du varroa aux médicaments.

1. Qu'est-ce qu'APIGUARD ?

- **APIGUARD** est un médicament à base de thymol, un composé naturel que l'on trouve dans le thym et dans certains miels comme le miel du tilleul.

- L'action du thymol contre varroa est déjà connue ainsi que son incidence favorable sur l'hygiène et la santé de la colonie.
- La mise au point du gel **APIGUARD** a permis de maîtriser l'utilisation et l'action du thymol et d'en faire un médicament.



Le gel **APIGUARD** régule la diffusion du thymol.

Il fonctionne comme un filet dont les mailles s'élargissent ou se rétractent à chaque variation de température. Lorsque la température augmente, la vitesse de diffusion du thymol s'accélère, mais les mailles du gel rétrécissent limitant ainsi l'évaporation du thymol.

2. Efficacité d'APIGUARD

- **APIGUARD** a un double mode d'action. D'une part, les vapeurs de thymol diffusent dans la colonie avec l'aide des abeilles ventileuses et agit contre les varroas par inhalation, d'autre part, les ouvrières transportent et répandent le gel dans la colonie. Le thymol élimine alors les varroas par contact. Il élimine les varroas présents dans la ruche ainsi que ceux provenant de l'extérieur par ré-infestation.

- La bonne efficacité d'**APIGUARD** a été prouvée par de nombreux tests conduits avec succès dans le monde entier et en France à l'AFSSA de Sophia-Antipolis. Des applications pratiques ont également été conduites par de nombreux apiculteurs dans toutes régions et climats de France. L'efficacité constatée a été en moyenne de 90%.

4. Conseils d'utilisation



Ouvrir la ruche. Ouvrir le couvercle de la barquette et laisser un des angles du couvercle fixé à la barquette. Placer la barquette sur le dessus des cadres, au centre, gel vers le haut.

S'assurer qu'un espace libre d'au moins 0.5 cm est disponible entre le haut de la barquette et le couvre

cadre. Fermer la ruche. Après deux semaines, remplacer la première barquette par une nouvelle barquette en suivant la même procédure. Laisser le produit dans la colonie jusqu'à ce que la barquette soit vide. Enlever le produit lors de la pause des hausses sur la colonie.

L'efficacité de la spécialité est optimisée si le produit est utilisé à la fin de l'été après la récolte du miel (lorsque la quantité de couvain est décroissante). Toutefois, en cas de forte infestation, la spécialité peut aussi être utilisée au printemps, lorsque la température est supérieure à 15°C.

L'efficacité peut varier entre les colonies en raison de la nature du produit. En conséquence, **APIGUARD** doit être utilisé comme un traitement parmi d'autres dans un programme de lutte intégrée, et la chute des varroas doit être suivie régulièrement. Si une chute des varroas significative est observée pendant l'hiver ou le printemps suivant, il est recommandé d'utiliser un autre traitement de la varroase en hiver ou au printemps.

5. Comment se procurer APIGUARD ?

APIGUARD est un médicament. Vous pouvez le trouver, sans ordonnance, dans une pharmacie, auprès d'un vétérinaire ou auprès du Groupement de Défense Sanitaire Apicole de votre département.

APIGUARD existe en 1 conditionnement : Boîte de 10 barquettes (traitement pour 5 ruches)

APIGUARD, gel à utiliser dans la ruche. **COMPOSITION** : Thymol 12,5g Excipient QSP 1 barquette de 50g de gel. **INDICATIONS** : Chez les abeilles : traitement de la varroase due à *Varroa destructor*. **EFFETS INDESIRABLES** : Une légère agitation de la colonie durant les jours suivant l'application est possible.

Occasionnellement, par forte température, une légère réduction des jeunes stades de couvain peut apparaître pendant le traitement. Ce phénomène est transitoire et n'a pas d'effet sur le développement de la colonie.

SURDOSAGE : L'utilisation d'une dose supérieure à celle recommandée (50g par application correspondant à 12,5g de thymol) peut causer des perturbations du comportement de la colonie (agitation, abandon ou augmentation de la mortalité). En cas de surdosage, enlever la dose excédente de la colonie.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE : Traitement de la ruche : 2 applications successives de 50g de gel par colonie à 2 semaines d'intervalle. **MODE D'ADMINISTRATION** : Ouvrir la ruche. Ouvrir le couvercle de la barquette et laisser un des angles du couvercle fixé à la barquette. Placer la barquette sur le dessus des cadres, au centre, gel vers le haut. S'assurer qu'un espace libre d'au moins 0.5 cm est disponible entre le haut de la barquette et le couvre cadre. Fermer la ruche. Après deux semaines, remplacer la première barquette par une nouvelle barquette en suivant la même procédure. Laisser le produit dans la colonie jusqu'à ce que la barquette soit vide. Enlever le produit lors de la pause des hausses sur la colonie. L'efficacité de la spécialité est optimisée si le produit est utilisé à la fin de l'été après la récolte du miel (lorsque la quantité de couvain est décroissante). Toutefois, en cas de forte infestation, la spécialité peut aussi être utilisée au printemps, lorsque la température est supérieure à 15°C. L'efficacité peut varier entre les colonies en raison de la nature du produit. En conséquence, **APIGUARD** doit être utilisé comme un traitement parmi d'autres dans un programme de lutte intégrée, et la chute des varroas doit être suivie régulièrement. Si une chute des varroas significative est observée pendant l'hiver ou le printemps suivant, il est recommandé d'utiliser un autre traitement de la varroase en hiver ou au printemps. **MISE EN GARDE PARTICULIERE A CHAQUE ESPECE CIBLE** : Un dosage incorrect pouvant causer des effets négatifs sur la colonie, il est important de respecter le dosage recommandé. **CONSERVATION** : Durée de conservation : 36 mois. Ne pas conserver à une température supérieure à 30°C. Ne pas congeler. Conserver le médicament dans l'emballage d'origine fermé. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct. Ne pas stocker à proximité des pesticides ou d'autres substances chimiques susceptibles de contaminer le produit. Tenir à l'écart des denrées alimentaires. **TEMPS D'ATTENTE** : Miel : zéro jour. Ne pas utiliser le médicament pendant la miellée pour éviter une possible altération du goût du miel. **CATEGORIE** : Médicament à usage vétérinaire. Titulaire de l'AMM : VITA (Europe) Ltd - BASINGSTOKE - ROYAUME-UNI. Exploitant de l'AMM : QALIAN - 49503 Segre

cedex. PRESENTATION : Boîte de 10 barquettes de 50 g : AMM n°FR/V/8103006 4/2001



[Apistan](#) - [Apiguard](#)

Tous droits réservés.

Pour toute information nous contacter au : **05 55 25 19 66**